

## ข้อมูลการปรึกษาแนะนำก่อนยุติการตั้งครรภ์

- 1) กระบวนการแท้งด้วยการใช้ยาจะคล้ายกับการแท้งโดยธรรมชาติ
- 2) การใช้ยาจะมี 2 แบบ คือยารวมมีฟีพริสโตนและไมโซพรอสตอล หรือยาเดี่ยวไมโซพรอสตอล ขอให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้ยา วัน เวลา ที่กำหนดให้ รวมทั้งวิธีการดูแลตนเอง จะเกิดการแท้งสมบูรณ์ 96-98% การทำในอายุครรภ์ที่น้อยและเร็วจะพบว่าช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
- 3) มี 1% ที่จะเกิดการแท้งด้วยการใช้ยาตัวแรกยามิฟีพริสโตน แต่ให้ใช้ยาตัวที่สองไมโซพรอสตอลด้วย เพื่อให้มีการแท้งที่สมบูรณ์
- 4) มีโอกาสเกิดการตกเลือด เมื่อใช้ยาแล้วไม่แท้งและตั้งครรรภ์ต่อ
- 5) คุณต้องเตรียมหาคนดูแลขณะใช้ยายุติการตั้งครรภ์
- 6) การใช้ยาอาจมีผลข้างเคียง/ แทรกซ้อนต่างๆ เช่น ไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตกเลือด แท้งไม่ครบ ติดเชื้อ และอาจต้องปรึกษา/รักษา โดยพยาบาล/แพทย์ เพิ่มเติม
- 7) กรณีการยุติฯโดยการดูดโพรงมดลูกอาจมีเลือดออกทางช่องคลอดได้นานถึง 2 สัปดาห์
- 8) กรณีการยุติฯโดยการใช้ยาอาจมีเลือดออกทางช่องคลอดได้นานถึง 7-14 วัน
- 9) อาจมีเลือดออกมากผิดปกติ ซึ่งประเมินได้จากการใช้ผ้าอนามัย 2 แผ่นใหญ่หรือมากกว่าต่อชั่วโมง ติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องให้เลือดจากการเสียเลือดมากพบได้ประมาณ 1 ใน 1,000
- 10) คุณต้องสามารถไปถึงโรงพยาบาลที่คุณหาข้อมูลไว้ให้เร็วที่สุดกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
- 11) กรณีที่มีอาการปวดท้องน้อยแบบปวดเกร็งเพิ่มมากขึ้น มีไข้ หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดมากและรุนแรง ให้กลับมาพบแพทย์
- 12) นัดมาติดตามผลหลังยุติการตั้งครรภ์ภายใน 1-2 สัปดาห์